

RAM+nab-PTX療法

部位	胃
1コース日数	28日間

【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
サイラムザ® (RAM)	8mg/kg	●														●													
アブラキサン® (nab-PTX)	100mg/m ²	●							●							●													

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 100mL	ルートキープ
② グラニセトロン 3mg/100mL ポララミン®注 5mg	30分間
③ RAM 生食 250mL	60分間 ^{※1}
④ 生食 50mL	全開
⑤ nab-PTX 生食 100mL	30分間

※1 2回目以降は30分間まで短縮可能

【主にチェックする検査値】
WBC NEUT Hb PLT AST ALT Cre
尿蛋白
【RAMのコース中止基準】
尿蛋白(2+)以上
非血液毒性≧Grade3
【nab-PTXのコース中止基準】
重篤な骨髄抑制のある患者
重篤な腎・肝障害のある患者
非血液毒性≧Grade3
【主な副作用】
[共通]
骨髄抑制 (WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下)
口内炎 下痢 悪心・嘔吐 食欲不振
味覚障害 など
[主にRAMによるもの]
尿蛋白 高血圧 鼻血・歯肉出血・喀血
血栓・塞栓症 Infusion Reaction (過敏症)
[主にnab-PTXによるもの]
末梢神経障害 脱毛