

IRIS療法

部位	大腸
1コース日数	28日間

【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
TS-1 (S-1)	80mg/m ²	1日1回 朝・夕食後														休薬													
イリノテカン (CPT-11)	150mg/m ²	●														●													

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 100mL	ルートキープ
② グラニセトロン 3mg/100mL デキサート®注 4mg ^{※1}	30分間
③ CPT-11 ソルデム3A 500mL	90分間

※1 制吐剤は嘔気訴え等で変更もあり

[参考]

(表1) 重篤な骨髄抑制の基準

検査値	Grade1
白血球 (WBC)	<3,000/mm ³
好中球 (NEUT)	<1,500/mm ³
血小板 (PLT)	<75,000/mm ³
ヘモグロビン (Hb)	<8.0g/dL

(CTCAE v5.0-JCOGより)

【主にチェックする検査値】
WBC NEUT Hb PLT AST ALT Cre
【コース中止基準】
重篤な骨髄抑制 (表1) のある患者
重篤な肝障害のある患者
重篤な腎障害のある患者 (Ccr<30mL/min)
非血液毒性 ≧ Grade3
【主な副作用】
[共通]
骨髄抑制 (WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下)
口内炎 悪心・嘔吐 食欲不振 味覚障害
脱毛 など
[主にS-1によるもの]
流涙
[主にCPT-11によるもの]
下痢