

# SOX + BEV療法

部位	大腸
1コース日数	21日間

## 【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	...				
TS-1 (S-1)	80mg/m <sup>2</sup>	1日1回 朝・夕食後														休薬					→2コース目							
オキサリプラチン (L-OHP)	130mg/m <sup>2</sup>	●																					●					
アバスチン® (BEV)	7.5mg/kg	●																					●					

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 100mL	ルートキープ
② BEV 生食 100mL	90分間 <sup>※1</sup>
③ グラニセトロン 3mg/100mL デキサート®注 8mg	30分間
L-OHP 5%糖液 250mL デキサート®注 4mg <sup>※2</sup>	2時間

※1 2回目は60分間、  
3回目以降は30分間まで短縮可能

※2 血管痛対策 (pH緩衝剤)

【コース中止基準】
重篤な骨髄抑制のある者
重篤な肝機能障害のある者
重篤な腎機能障害のある者
尿蛋白(2+)以上
非血液毒性 ≧ Grade3

【主にチェックする検査値】
WBC NEUT Hb PLT AST ALT Cre
尿蛋白
【主な副作用】
[共通]
骨髄抑制 (WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下)
口内炎 下痢 悪心・嘔吐 食欲不振
味覚障害 脱毛 など
[主にL-OHPによるもの]
血管痛 (L-OHP投与時) 末梢神経障害
[主にS-1によるもの]
流涙
[主にBEVによるもの]
尿蛋白 高血圧 鼻血・歯肉出血・喀血
血栓・塞栓症 Infusion Reaction (過敏症)