CBDCA+PEM療法

部位	肺
1コース日数	21日間

【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	…						
カルボプラチン（CBDCA）	AUC=5	●																											
アリムタ®（PEM）	500mg/㎡	●																											

アリムタ®による毒性軽減のため、9週間に1回 メコバラミン 1mgを筋注、パンビタン®末を1g/日以上内服

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 50mL	ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ
② プロイメンド®点滴静注用 150mg※1 生食 100mL	30分間
③ 生食 20mL	ﾌﾗｯｼｭ
④ パロノセトロン 0.75mg※1 デキサート®注 8mg 生食 100mL	30分間
⑤ PEM 生食 100mL	10分間
⑥ CBDCA 生食 250mL	50分間
⑦ 生食 100mL	全開

※1 制吐剤は嘔気訴え等で変更もあり

【主にチェックする検査値】

WBC　NEUT　Hb　PLT　AST　ALT　Cre

【コース中止基準】

重篤な骨髄抑制

重篤な腎機能障害

重篤な肝機能障害

非血液毒性≧Grade3

【主な副作用】

［共通］

骨髄抑制（WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下）

口内炎　下痢　悪心・嘔吐　食欲不振

味覚障害　脱毛 など

［主にCBDCAによるもの］

末梢神経障害

［主にPEMによるもの］

発疹