PEM+BEV療法

部位	肺
1コース日数	21日間

【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	…						
アリムタ® (PEM)	500mg/㎡	●																											
アバスチン® (BEV)	15mg/kg	●																											

アリムタによる毒性軽減のため、9週間に1回 メコバラミン 1mgを筋注、パンビタン®末を1g/日以上内服

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 100mL	ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ
② BEV 生食 100mL	90分間※1
④ グラニセトロン 3mg/100mL デキサート®注 8mg※2	30分間
⑤ PEM 生食 100mL	10分間
⑦ 生食 100mL	全開

※1 2回目は60分間、
3回目以降は30分間まで短縮可能

※2 制吐剤は嘔気訴え等で変更もあり

【主にチェックする検査値】
WBC　NEUT　Hb　PLT　AST　ALT　Cre
尿蛋白
【コース中止基準】
重篤な骨髄抑制
重篤な腎機能障害
重篤な肝機能障害
非血液毒性≧Grade3
尿蛋白 (2+)以上
【副作用】
[共通]
骨髄抑制（WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下）
口内炎　下痢　悪心・嘔吐　食欲不振
味覚障害　脱毛 など
[主にPEMによるもの]
発疹
[主にBEVによるもの]
尿蛋白　高血圧　鼻血・歯肉出血・喀血
血栓・塞栓症　Infushion Reaction（過敏症）