

# PEM療法

部位	肺
1コース日数	21日間

## 【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...						
アリムタ® (PEM)	500mg/m <sup>2</sup>	●																											

アリムタ®による毒性軽減のため、9週間に1回 メコバラミン 1mgを筋注、パンビタン®末を1g/日以上内服

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 100mL	ルートキープ
② グラニセトロン 3mg/100mL デキサート®注 8mg <sup>※1</sup>	30分間
③ PEM 生食 100mL	10分間
④ 生食 100mL	全開

※1 制吐剤は嘔気訴え等で変更もあり

<b>【主にチェックする検査値】</b>
WBC NEUT Hb PLT AST ALT Cre
<b>【コース中止基準】</b>
重篤な骨髄抑制
重篤な腎機能障害
重篤な肝機能障害
非血液毒性 ≧ Grade3
<b>【副作用】</b>
骨髄抑制 (WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下)
口内炎 下痢 悪心・嘔吐 食欲不振
味覚障害 脱毛 発疹 など