

Pembrolizumab療法

| | |
|--------|------|
| 部位 | 肺 |
| 1コース日数 | 21日間 |

【レジメンスケジュール】

| 薬剤名 | 投与量 | Day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ... | | | | | |
|----------------------------|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|
| キイトルーダ® (Pembrolizumab) | 200mg (固定量) | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 注射薬投与スケジュール | 投与時間 |
|-----------------------------|--------|
| ① 生食 100mL | ルートキーブ |
| ② Pembrolizumab 生食 100mL | 30分間 |
| ③ 生食 50mL | フラッシュ |

| 【主にチェックする検査値】 |
|-------------------------------|
| WBC NEUT Hb PLT AST ALT Cre |
| FreeT3 FreeT4 TSH コルチゾール ACTH |
| HbA1c など |
| |
| 【コース中止基準】 |
| 間質性肺炎 大腸炎 内分泌障害 |
| 腎機能障害 肝機能障害 |
| その他 |
| |
| 【副作用】 |
| Infusion Reaction (過敏症) |
| 免疫関連有害事象 (irAE) |
| |