

GC療法

部位	胆道
1コース日数	21日間

【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...						
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	●							●																				
シスプラチン (CDDP)	20mg/m ²	●							●																				

Short Hydrationメニュー：CDDP投与当日から3日目まで、1.5L/日以上 of 飲水を指導
(CDDPによる腎障害予防のため)

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 100mL	ルートキープ
② パロノセトロン 0.75mg ^{※1} デキサート®注 8mg 生食 100mL	30分間
③ 硫酸Mg補正液 20mL 生食 500mL	60分間
④ CDDP 生食 250mL	60分間
⑤ 生食 50mL	全開
⑥ GEM 生食 100mL	30分間
⑦ 生食 20mL	フラッシュ
⑧ ラシックス 20mg	静注

【主にチェックする検査値】
WBC NEUT Hb PLT AST ALT Cre
【コース中止基準】
重篤な骨髄抑制
重篤な腎機能障害
重篤な肝機能障害
非血液毒性 ≧ Grade3
【主な副作用】
[共通]
骨髄抑制 (WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下)
口内炎 下痢 皮膚症状 脱毛 味覚障害 など
[主にCDDPによるもの]
嘔気・嘔吐 食欲不振 末梢神経障害
腎機能障害
[主にGEMによるもの]
間質性肺炎

※1 制吐剤は嘔気訴え等で変更もあり