

nab-PTX+GEM療法

(Weeklyメニュー)

部位	膀胱
1コース日数	28日間

【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	…	…	…	…	…	28
アブラキサン® (nab-PTX)	125mg/m ²	●							●							●													
ゲムシタビン (GEM)	1000mg/m ²	●							●							●													

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 50mL	ルートキープ
② グラニセトロン 3mg/100mL デキサート®注 4mg ^{*1}	30分間
③ nab-PTX 生食 100mL	30分間
④ 生食 50mL	フラッシュ
⑤ GEM 生食 100mL	30分間
⑥ 生食 50mL	フラッシュ

*1 制吐剤は嘔気訴え等で変更もあり

【主にチェックする検査値】
WBC NEUT Hb PLT AST ALT Cre
【コース中止基準】
重篤な骨髄抑制
重篤な腎機能障害
重篤な肝機能障害
非血液毒性 ≧ Grade3
【主な副作用】
[共通]
骨髄抑制 (WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下)
口内炎 下痢 悪心・嘔吐 食欲不振
皮膚症状 味覚障害 など
[主にnab-PTXによるもの]
末梢神経障害 脱毛
[主にGEMによるもの]
間質性肺炎